



Vaccinatie COVID-19

Bereidingswijze vaccin Pfizer



1

Ingevroren flacons moeten in een omgeving van **2 °C tot 8 °C** geplaatst worden om te **ontdooien**; het kan 3 uur duren om een pak van 195 flacons te ontdooien.

Een andere mogelijkheid bestaat erin om **ingevroren flacons** te **ontdooien** door ze gedurende **30 minuten** bloot te stellen aan een temperatuur tot **25 °C** voor onmiddellijk gebruik.

Eenmaal ontdooid, kan het **onverdunde vaccin tot 5 dagen bewaard** worden bij een temperatuur van 2 °C tot 8 °C, en tot 2 uur bij een temperatuur tot 25 °C.

2



Laat de **ontdooide flacon** op kamertemperatuur komen en **keer hem 10 maal voorzichtig om** alvorens te verdunnen. Niet schudden. Vóór de verdunning moet het vaccin eruitzien als een oplossing met gebroken witte kleur zonder zichtbare deeltjes. Gooi het vaccin weg als er deeltjes of verkleuring zichtbaar zijn.

3

Het ontdooide vaccin moet verdund worden in de oorspronkelijke flacon met een oplossing van 1,8 mL natriumchloride 9 mg/mL (0,9 %) voor injectie, met gebruik van een naald van 21 gauge of een smallere naald en steriele technieken.

Waarschuwing: Natriumchloride 9 mg/mL (0,9 %)-oplossing voor injectie zonder conserveermiddel is het enige verdunningsmiddel dat gebruikt mag worden. Dit verdunningsmiddel is niet inbegrepen in de verpakking van het vaccin.

Let op: Desinfecteer de flaconstop eerst met een ontsmettingsdoekje.



4

Normaliseer de druk in de flacon alvorens de naald uit de flacon te verwijderen door 1,8 mL lucht op te trekken in de lege spuit waar het verdunningsmiddel in zat.

5

Keer de verdunde oplossing voorzichtig 10 maal om. Niet schudden.

6

Het verdunde vaccin moet eruitzien als een **oplossing met gebroken witte kleur zonder zichtbare deeltjes**. Gooi het verdunde vaccin weg als er deeltjes of verkleuring zichtbaar zijn.

7

Duid op de verdunde flacons de **datum en tijd van verdunning aan** en bewaar bij een temperatuur van 2 °C tot 25 °C. Gebruik onmiddellijk, en binnen 6 uren na verdunning.

8

Na verdunning bevat de flacon 5 doses van 0,3 mL. Trek de benodigde 0,3 mL dosis verdund vaccin op met gebruik van een steriele naald en spuit. Gooi ongebruikt vaccin weg binnen 6 uren na verdunning.

Let op: Desinfecteer de flaconstop eerst met een ontsmettingsdoekje.

Gebruik voor elke extra dosis een nieuwe steriele injectiespuit en naald en zorg ervoor dat de flaconstop wordt ontsmet met een antiseptisch middel.