
Vaccination COVID-19 Mode de préparation vaccin Pfizer




Les flacons congelés doivent être transférés à une température comprise entre 2 et 8 °C pour décongeler. La décongélation d'un emballage de 195 flacons peut prendre 3 heures.

Les flacons congelés peuvent également être décongelés pendant 30 minutes à une température allant jusqu'à 25 °C pour une utilisation immédiate.

Une fois décongelé, le vaccin non dilué peut être stocké pendant 5 jours maximum à une température comprise entre 2 et 8 °C et jusqu'à 2 heures à une température allant jusqu'à 25 °C.



Laissez le flacon décongelé arriver à température ambiante et retournez-le doucement 10 fois avant dilution. N'agitez pas le flacon. Avant la dilution, le vaccin devrait se présenter sous la forme d'une solution blanc cassé sans aucune particule visible. Jetez le vaccin s'il présente une coloration ou des particules.




Le vaccin décongelé doit être dilué dans son flacon d'origine avec 1,8 ml d'une solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %), en utilisant une aiguille de calibre 21 ou plus fine et en respectant les règles d'asepsie.


Avertissement : Seule une solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) sans conservateur peut être utilisée comme diluant. Ce diluant n'est pas fourni avec les vaccins.

Attention : désinfectez d'abord le bouchon du flacon avec un chiffon désinfectant.





Egalisez la pression du flacon avant d'en retirer l'aiguille en prélevant 1,8 ml d'air dans la seringue de diluant vide.



Retournez délicatement la solution diluée 10 fois. N'agitez pas le flacon.


Le vaccin dilué doit se présenter sous la forme d'une solution blanc cassé sans aucune particule visible.

Jetez le vaccin dilué s'il présente une coloration ou des particules.



La date et l'heure de la dilution doivent être indiquées sur les flacons dilués qui doivent être conservés à une température comprise entre 2 et 25 °C.

Utilisez-les immédiatement et au plus tard dans les 6 heures après dilution.



Après dilution, le flacon contient 5 doses de 0,3 ml.
Prélevez la dose requise de 0,3 ml de vaccin dilué
à l'aide d'une seringue et d'une aiguille stériles et jetez
le vaccin inutilisé 6 heures après la dilution.

Attention : désinfectez d'abord le bouchon du flacon avec un chiffon désinfectant.

Pour chaque dose supplémentaire, utilisez une nouvelle seringue et une nouvelle aiguille stériles et assurez-vous que le bouchon du flacon est désinfecté avec un antiseptique.

