



Vaccinatiekaart COVID-19 vaccin (Pfizer)

Vragen vóór toediening:

- 1 Ooit een onmiddellijke of ernstige allergische reactie gehad na toediening van een vaccin of na inname van een geneesmiddel waarvoor dringende medische zorgen nodig waren?
- 2 Onlangs positief getest op COVID-19?
- 3 Vandaag koorts of symptomen die kunnen wijzen op een infectie?
- 4 Verhoogde bloedingsneiging (lang nabloeden bij wonde) of gebruik van antistollingsmedicatie (Marcoumar, Marevan, Sintrom) of Aspirine?

+ op vraag 1 = niet vaccineren

**+ op vraag 2 = symptomen afwezig > 2 weken: vaccineren
symptomen afwezig < 2 weken: vaccinatie uitstellen**

+ op vraag 3 = vaccinatie uitstellen

+ op vraag 4 = informeren over verhoogde kans ecchymose

Observatieperiode na de vaccinatie: 15 minuten

Allergische reactie bij vaccinaties

De symptomen van een overgevoelighedsreactie treden op binnen de eerste minuten na de inspuiting:

	Anafylactische reactie	Licht allergische reactie	Vasovagale reactie
SS	Hypotensie	Opwinding	Hypotensie
	Tachycardie	Geen cardiovasculaire SS	Bradycardie
	Urticaria	Urticaria	<u>Geen</u> urticaria
	Pruritus	Pruritus	
	Angio-oedeem	Erytheem	
	Larynxoedeem	Hittegevoel	<u>Geen</u> ademhalingsstoornissen
R/	Neerleggen		Neerleggen
	Benen in hoogstand		Benen in hoogstand
	Epipen of adrenaline 0.5 ml I.M = 1/2 amp (tweede helft evt na 5' herhalen)	Antihistaminicum - Cetirizine PO	

Bij uitgesproken symptomen verwittig MUG met info ABC



NINS 03 02 07B V7

