



Carnet de vaccination vaccin COVID-19 (Moderna)

Questions à poser avant l'administration :

- 1 Avez-vous déjà eu une réaction allergique immédiate ou grave après avoir reçu un vaccin ou pris un médicament qui a nécessité une attention médicale urgente ?
- 2 Avez-vous été récemment testé positif pour le COVID-19 ?
- 3 Souffrez-vous ce jour de fièvre ou des symptômes qui peuvent indiquer une infection ?
- 4 Avez-vous tendance aux saignements (continuer à saigner après blessure) ou prenez-vous des médicaments anticoagulants (Marcoumar, Marevan, Sintrom) ou Aspirine ?

+ à la question 1 = ne pas vacciner

**+ à la question 2 = absence de symptômes > 2 semaines : vacciner
absence de symptômes < 2 semaines : reporter la vaccination**

+ à la question 3 = reporter la vaccination

+ à la question 4 = informer sur le risque accru d'ecchymose

Période d'observation après la vaccination : 15 minutes

Réactions allergiques lors de l'administration des vaccins

Les symptômes d'une réaction d'hypersensibilité se manifestent quelques minutes après l'injection :

	<i>Réaction anaphylactique</i>	<i>Légère réaction allergique</i>	<i>Réaction vaso-vagale</i>
SS	Hypotension	Agitation	Hypotension
	Tachycardie	Pas de symptômes CV	Bradycardie
	Urticaire	Urticaire	<u>Pas</u> d'urticaire
	Prurit	Prurit	
	Angio-oedème	Erythème	
	Oedème laryngé	Sensation de chaleur	<u>Pas</u> de troubles respiratoire
R/	Mettre en position couchée		Mettre en position couchée
	Jambes surélevées		Jambes surélevées
	Epipen ou adrénaline 0.5 ml I.M = 1/2 amp (2 ^{ième} demi après 5')	Antihistaminiques - Cetirizine PO	

Si symptômes prononcés prévenir le SAMU avec info ABC.



FINS Q3 02 07B V7

