

Vaccinatie COVID-19

Bereidingswijze vaccin Moderna



1

Ingevroren flacons kunnen **7 maanden** of tot de vermelde vervaldatum worden bewaard op **-20°C** in hun originele verpakking en afgeschermd van licht.

Eenmaal ontdooid, kan een ongeopende flacon tot maximaal **30 dagen** gekoeld bewaard worden **tussen 2 en 8 °C** en beschermd tegen licht alvorens gebruik.

Eenmaal **ontdooit**, kan een **ongeopende flacon tot 12 uur** bewaard worden op kamertemperatuur (**8-25°C**).

Geopende **doorprikte flacons** moeten binnen de **6 uur** gebruikt worden.

2

Het moderna vaccin is in **vloeibare fase** (ontdooit) onderhevig aan **grensvlakspanning**. Het product moet met de nodige voorzichtigheid behandeld worden:


- Vermijd schokken, vallen, trillingen (opgelet met intern transport: verplaatsing over oneffen terrein moet vermeden worden)
- Niet schudden van de flacons
- Geopende/doorprikte flacons mogen NOOIT getransporteerd worden

3

Haal het aantal flacons nodig voor vaccinatie uit de koelkast en **noteer het tijdstip** waarop ze uit de koelkast zijn gehaald.

Laat de flacons gedurende **15 minuten equilibreren** op kamertemperatuur.

Draai de injectieflacon voorzichtig om (niet schudden)
Verifieer of de vloeistof in de flacon **wit of gebroken wit** is qua kleur. Indien verkleuring of onzuiverheden aanwezig zijn, mag de flacon niet worden gebruikt. Verwijder deze dan in de naaldcontainer.




4

Het Moderna-vaccin moet **niet verdund** worden.

5

- ✓ Uit elke flacon kunnen **10 vaccins** opgetrokken worden
- ✓ Elk individueel vaccin bevat **0,5 ml**



1. **Onstmet de flacon** met een alcoholswab
2. Gebruik **één optreknaald** (18-21 gauge) waarop de individuele spuiten worden gezet
3. Trek uit elke flacon **10 vaccins van 0,5 ml**
4. Ontkoppel de spuit van de optreknaald die in de flacon blijft zitten
5. Voorzie elk opgetrokken vaccin na ont koppeling van de optreknaald van een **nieuwe steriele IM-naald** (23-25 gauge)
6. Verifieer of de **vloeistof** in de spuit **wit of gebroken wit** is qua kleur.
7. Controleer het **eindvolume** van **0,5 ml**
8. Dien het vaccin niet toe indien het eindvolume niet correct is, of verkleuring en andere partikels aanwezig zijn.

6

Het Moderna COVID-19 vaccin is **vrij van bewaarmiddelen**. Een vaccin moet **gebruikt worden binnen de 6 uur** na het openen en doorprikken van de flacon.

Eens de flacon doorpikt is voor het optrekken van de eerste dosis moet de inhoud van de flacon gebruikt worden binnen de 6 uur. Doorpikte flacons die niet binnen de 6 uur zijn gebruikt, worden weggegooid!



Zorg ervoor dat de flaconstop wordt ontsmet met een antiseptisch middel.